


ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ?

1
Вызвать
скорую помощь



2
Положить пострадавшего на бок
(голова должна находиться на согнутой
руке, левая нога согнута в колене),
нижнюю челюсть выдвинуть вперед
до уровня верхней, вытащить язык,
освободить рот от инородных тел
(зубные протезы, жвачка и т.д.)



3
Использовать
препарат «Налоксон»




Вводится внутримышечно в дозе 1–2 мл. Действует
незамедлительно, эффект длится 30–60 минут. Если
эффекта нет, следует повторить инъекцию в той же дозе
через 3–5 минут.

4
Если человек не дышит,
сделать искусственное
дыхание



5
Если нет пульса, начать
непрямой массаж сердца



ВАЖНО!

**НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ ПРЕПАРАТ
В ОДИНОЧЕСТВЕ**

При отравлении метадонам вы будете
не в состоянии оказать себе помощь
самостоятельно, что приведет
к смертельному исходу

ВАЖНО!

**СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ДОЗИРОВКУ
ПРЕПАРАТА ВЫДЕРЖИВАЙТЕ ПЕРЕРЫВ
2–3 ДНЯ МЕЖДУ УКОЛАМИ.**

Действие метадона в сравнении с другими
опиоидами наступает медленнее, поэтому
желание ускорить эффект путем повышения
дозы приведет к передозировке.

**ОСТАНАВЛИВАЙТЕ ПРИЕМ
МЕТАДОНА ПОД КОНТРОЛЕМ ВРАЧА**

Постепенно снижайте дозу в течение 2–3 недель

**ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО
ВОЗДЕРЖАНИЯ ОТ ОПИАТОВ
ДАЖЕ НЕБОЛЬШАЯ ДОЗА
МЕТАДОНА МОЖЕТ БЫТЬ
СМЕРТЕЛЬНА**

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ

250 ЧЛОВЕК

умерло от отравления наркотиками
в Тюменской области в 2021 году

ПРИЧИНЫ ПЕРЕДОЗИРОВКИ

1. Первый прием метадона.
2. Случайное или намеренное превышение дозы.
3. Нелегальный препарат неизвестного качества, состава и концентрации.
4. Наличие хронических инфекций и других заболеваний.
5. Длительный перерыв в употреблении наркотиков.
6. Параллельное употребление других лекарственных препаратов, которые усиливают побочное действие метадона на дыхательную систему.

ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ:

- тошнота, рвота, пена изо рта;
- сильная заторможенность, сонливость;
- мышечные судороги;
- сужение зрачков;
- холодный пот;
- изменение цвета кожи (бледность, покраснение);
- слабый пульс;
- потеря сознания;
- кома;
- отсутствие дыхания;
- остановка сердца.

>85%

НАРКОТИКОВ

вызывающих смерть, относятся
к веществам группы опиоидов,
в том числе высокоочищенный метадон



**АДРЕСА КАБИНЕТОВ АНОНИМНОГО
(БЕЗ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ) БЕСПЛАТНОГО
ПЕРВИЧНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ:**

г. Тюмень, ул. Семакова, 11,

тел.: 8 (3452) 62-02-77, 8 (3452) 46-15-36

г. Тобольск, ул. Первомайская, 22а, корп. 1,

тел.: 8 (3456) 25-24-86

г. Ишим, ул. Железнодорожная, 2,

тел.: 8 (34551) 60-96-1



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

112 03 103